

P1-13-9

204389

पेपर-1 PAPER-1

CODE

9

समय : 3 घण्टे

Time : 3 Hours

महत्तम अंक : 180

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको 5 मिनट विशेष रूप से इस काम के लिए दिये गये हैं।
Please read the instructions carefully. You are allotted 5 minutes specifically for this purpose.

निर्देश / INSTRUCTIONS

A. सामान्य:

- यह पुस्तिका आपका प्रश्न-पत्र है। इसकी मुहरें तब तक न तोड़ें जब तक निरीक्षकों के द्वारा इसका निर्देश न दिया जाये।
- प्रश्न-पत्र का कोड (CODE) इस पृष्ठ के ऊपरी दाँए कोने और इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ (पृष्ठ संख्या 44) पर छपा है।
- कच्चे कार्य के लिए खाली पृष्ठ और खाली स्थान इस पुस्तिका में ही हैं। कच्चे कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कागज नहीं दिया जायेगा।
- कोरे कागज, विलप बोर्ड, लॉग तालिका, रसाइंड रूल, कैल्कुलेटर, कैमरा, सेलफोन, पेजर और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में अनुमत नहीं हैं।
- इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम और रोल नम्बर लिखिए।
- प्रश्नों के उत्तर और अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ एक दो-भाग कार्बन रहित कागज, जो अलग से दिया जाएगा, पर भरी जायेंगी। परीक्षा समाप्ति के बाद निरीक्षक के निर्देश पर ही यह भाग अलग करने हैं। ऊपरी पृष्ठ मशीन-जाँच ऑब्जेक्टिव रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस., ORS) है, जो निरीक्षक द्वारा वापस ले ली जायेगी। निचला पृष्ठ आप परीक्षा के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं।
- ऊपरी मूल पृष्ठ के बुलबुलों (BUBBLES) को काले बॉल पाइंट कलम से काला करें। इतना दबाव डालें कि निचले डुप्लीकेट पृष्ठ पर निशान बन जाये।
- ओ.आर.एस. (ORS) या इस पुस्तिका में हेर-फेर / विकृति न करें।
- इस पुस्तिका की मुहरें तोड़ने के पश्चात् कृपया जाँच लें कि इसमें 44 पृष्ठ हैं और सभी 60 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। सभी खंडों के प्रारंभ में दिये हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

A. General:

This booklet is your Question Paper. Do not break the seals of this booklet before being instructed to do so by the invigilators.

The question paper CODE is printed on the right hand top corner of this sheet and on the back page (Page No. 44) of this booklet.

Blank spaces and blank pages are provided in the question paper for your rough work. No additional sheets will be provided for rough work.

Blank papers, clipboards, log tables, slide rules, calculators, cameras, cellular phones, pagers and electronic gadgets are NOT allowed inside the examination hall..

Write your name and roll number in the space provided on the back cover of this booklet.

Answers to the questions and personal details are to be filled on a two-part carbon-less paper, which is provided separately. These parts should only be separated at the end of the examination when instructed by the invigilator. The upper sheet is a machine-readable Objective Response Sheet (ORS) which will be retained by the invigilator. You will be allowed to take away the bottom sheet at the end of the examination.

Using a black ball point pen darken the bubbles on the upper original sheet. Apply sufficient pressure so that the impression is created on the bottom duplicate sheet.

DO NOT TAMPER WITH/MUTILATE THE ORS OR THE BOOKLET.

On breaking the seals of the booklet check that it contains 44 pages and all the 60 questions and corresponding answer choices are legible. Read carefully the instruction printed at the beginning of each section.

B. Filling the right part of the ORS

The ORS also has a CODE printed on its left and right parts.

Check that the CODE printed on the ORS (on both sheets) is the same as that on this booklet and put your signature affirming that you have verified this.

IF THE CODES DO NOT MATCH, ASK FOR A CHANGE OF THE BOOKLET.

कृपया शेष निर्देशों के लिये इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

Please read the last page of this booklet for rest of the instructions

निरीक्षक के अनुदेशों के मुहरें न तोड़ें।
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING
INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

निरीक्षा के अनुदेशों के मुहरें न तोड़ें।
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING
INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

| | विषय Subject | खण्ड Section | | पृष्ठ संख्या Page No. |
|---------------------|----------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| भाग I Part I | भौतिक विज्ञान Physics | 1 | केवल एक सही विकल्प प्रकार Only One Option Correct Type | 3 - 8 |
| | | 2 | एक या अधिक सही विकल्प प्रकार One or More Options Correct Type | 9 - 13 |
| | | 3 | पूर्णांक मान सही प्रकार Integer Value Correct Type | 14 - 16 |
| भाग II Part II | रसायन विज्ञान Chemistry | 1 | केवल एक सही विकल्प प्रकार Only One Option Correct Type | 17 - 23 |
| | | 2 | एक या अधिक सही विकल्प प्रकार One or More Options Correct Type | 24 - 27 |
| | | 3 | पूर्णांक मान सही प्रकार Integer Value Correct Type | 28 - 29 |
| भाग III Part III | गणित Mathematics | 1 | केवल एक सही विकल्प प्रकार Only One Option Correct Type | 30 - 35 |
| | | 2 | एक या अधिक सही विकल्प प्रकार One or More Options Correct Type | 36 - 39 |
| | | 3 | पूर्णांक मान सही प्रकार Integer Value Correct Type | 40 - 42 |

कच्चे कार्य के लिए स्थान / Space for Rough Work



PART I : PHYSICS

SECTION – 1 : (Only One option correct Type)

खण्ड – 1 : (केवल एक सही विकल्प प्रकार)

This section contains 10 multiple choice questions. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which ONLY ONE is correct.

इस खण्ड में 10 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से केवल एक सही है।

1. A pulse of light of duration 100 ns is absorbed completely by a small object initially at rest. Power of the pulse is 30 mW and the speed of light is $3 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$. The final momentum of the object is

(A) $0.3 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(B) $1.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(C) $3.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(D) $9.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

एक छोटी वस्तु, जो प्रारम्भ में विराम अवस्था में है, प्रकाश की 100 ns की एक स्पंद को पूर्णतया अवशोषित करती है। स्पंद की शक्ति 30 mW है व प्रकाश की गति $3 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$ है। वस्तु का अंतिम संवेग है :

(A) $0.3 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(B) $1.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(C) $3.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

(D) $9.0 \times 10^{-17}\text{ kg ms}^{-1}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



2. One end of a horizontal thick copper wire of length $2L$ and radius $2R$ is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R . When the arrangement is stretched by applying forces at two ends, the ratio of the elongation in the thin wire to that in the thick wire is

(A) 0.25 (B) 0.50 (C) 2.00 (D) 4.00

एक $2L$ लम्बाई व $2R$ त्रिज्या के मोटे क्षेत्रिज तार के एक सिरे को L लम्बाई व R त्रिज्या वाले एक पतले क्षेत्रिज तार से वेलिंग के द्वारा जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के दोनों सिरों पर बल लगाकर ताना जाता है। पतले व मोटे तारों में दैर्घ्यवृद्धि का अनुपात निम्न है:

(A) 0.25 (B) 0.50 (C) 2.00 (D) 4.00

3. The work done on a particle of mass m by a force, $K \left[\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{j} \right]$

(K being a constant of appropriate dimensions), when the particle is taken from the point $(a, 0)$ to the point $(0, a)$ along a circular path of radius a about the origin in the x - y plane is


(A) $\frac{2K\pi}{a}$ (B) $\frac{K\pi}{a}$
 (C) $\frac{K\pi}{2a}$ (D) $\checkmark 0$

एक बल, $K \left[\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \hat{j} \right]$ (K एक उचित विमा का स्थिरांक है), एक m

द्रव्यमान के कण को $(a, 0)$ बिन्दु से $(0, a)$ बिन्दु तक एक a त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ले जाता है, जिसका केन्द्र x - y तल का मूल बिन्दु है। इस बल द्वारा किया गया कार्य निम्न है:


(A) $\frac{2K\pi}{a}$ (B) $\frac{K\pi}{a}$
 (C) $\frac{K\pi}{2a}$ (D) 0

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



4. Two rectangular blocks, having identical dimensions, can be arranged either in configuration I or in configuration II as shown in the figure. One of the blocks has thermal conductivity κ and the other 2κ . The temperature difference between the ends along the x -axis is the same in both the configurations. It takes 9 s to transport a certain amount of heat from the hot end to the cold end in the configuration I. The time to transport the same amount of heat in the configuration II is

दो समरूपी आयताकार गुटकों को दर्शाये चित्रानुसार दो विन्यासों I और II में व्यवस्थित किया गया है। गुटकों की ऊष्मा चालकता κ व 2κ है। दोनों विन्यासों में x -अक्ष के दोनों छोरों पर तापमान का अन्तर समान है। विन्यास I में, ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा गरम छोर से ठंडे छोर तक अभिगमन में 9 s लेती है। विन्यास II में, समान मात्रा की ऊष्मा के अभिगमन के लिए समय है:

(A) 2.0 s (B) 3.0 s (C) 4.5 s (D) ~~6.0 s~~

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$R = \frac{l}{\kappa} \left[\frac{1}{(m^2 + y^2)^{1/2}} + \frac{1}{(n^2 + y^2)^{1/2}} \right]$$

$$R_f = \frac{l}{\kappa_1} + \frac{l}{\kappa_2}$$

$$\frac{l}{\kappa_1} + \frac{l}{\kappa_2} = \frac{2l}{\kappa}$$

$$R_f = \frac{l}{\kappa}$$

$$2\kappa_1 R + 2\kappa_2 R = 2\kappa R$$

* 9

5. A ray of light travelling in the direction $\frac{1}{2}(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$ is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction $\frac{1}{2}(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$. The angle of incidence is
 (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 75°

एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की प्रगामी दिशा $\frac{1}{2}(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$ है। परावर्तन के

बाद प्रगामी दिशा $\frac{1}{2}(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$ हो जाती है। किरण का आपतन कोण है :

- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 75°


6. The diameter of a cylinder is measured using a Vernier callipers with no zero error. It is found that the zero of the Vernier scale lies between 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale. The Vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 cm . The 24^{th} division of the Vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is

- (A) 5.112 cm (B) 5.124 cm (C) 5.136 cm (D) 5.148 cm

एक बेलन का व्यास मापने के लिए शून्य त्रुटि रहित एक वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग होता है। मापने के दौरान वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के 5.10 cm और 5.15 cm के बीच में पाया जाता है। वर्नियर पैमाने के 50 भाग 2.45 cm के तुल्य हैं। इस वर्नियर पैमाने का चौबीसवाँ (24^{th}) भाग मुख्य पैमाने के एक भाग से सटीक संपाती होता है। बेलन का व्यास है :

- (A) 5.112 cm (B) 5.124 cm (C) 5.136 cm (D) 5.148 cm

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



7. Two non-reactive monoatomic ideal gases have their atomic masses in the ratio 2 : 3. The ratio of their partial pressures, when enclosed in a vessel kept at a constant temperature, is 4 : 3. The ratio of their densities is

(A) 1 : 4 (B) 1 : 2 (C) 6 : 9 (D) 8 : 9

दो अनभिक्रियाशील एक-परमाणुक आदर्श गैसों का परमाणु द्रव्यमान $2 : 3$ के अनुपात में है। जब इनको एक स्थिरतापीय बर्तन में परिवद्ध किया जाता है, तब इनके आंशिक दाबों का अनुपात $4 : 3$ है। इनके घनत्व का अनुपात है :

8. In the Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength λ , the path difference (in terms of an integer n) corresponding to any point having half the peak intensity is

(A) $(2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (B) $(2n+1)\frac{\lambda}{4}$ (C) $(2n+1)\frac{\lambda}{8}$ (D) $(2n+1)\frac{\lambda}{16}$

एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में λ तरंग-दैर्घ्य के एकवर्णी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बिन्दु का जिस पर प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी है, पथान्तर है (पूर्णक n के पदों में) :

(A) $(2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (B) $(2n+1)\frac{\lambda}{4}$ (C) $(2n+1)\frac{\lambda}{8}$ (D) $(2n+1)\frac{\lambda}{16}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

* 9

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

9. The image of an object, formed by a plano-convex lens at a distance of 8 m behind the lens, is real and is one-third the size of the object. The wavelength of light inside the lens is $\frac{2}{3}$ times the wavelength in free space. The radius of the curved surface of the lens is

(A) 1 m (B) 2 m (C) 3 m (D) 6 m

एक समतल उत्तल लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के 8 m पीछे बनाता है जो कि वस्तु के आकार का एक-तिहाई है। लेंस के अन्दर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निर्वात की तरंगदैर्घ्य से $\frac{2}{3}$ गुना है। लेंस के गोलीय वंक्रित पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है :

(A) 1 m (B) 2 m (C) 3 m (D) 6 m

10. A particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u_0 at an angle α with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u_0 . The angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision is

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} + \alpha$ (C) $\frac{\pi}{2} - \alpha$ (D) $\frac{\pi}{2}$

एक m द्रव्यमान के कण को प्रारंभिक गति u_0 से क्षेत्रिज से α -कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यह कण प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिन्दु पर एक समान द्रव्यमान के कण के साथ पूर्णतः अप्रत्यारक्ष संघट्ट करता है, जो कि भूतल से ऊर्ध्वाधर दिशा में समान प्रारंभिक गति u_0 से फेंका गया था। संयुक्त निकाय संघट्ट के तत्काल बाद क्षेत्रिज से निम्न कोण बनाएगा :


(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} + \alpha$ (C) $\frac{\pi}{2} - \alpha$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Mechanics

$$\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{f} - 1 \right) \left(\frac{1}{R} \right)$$

$f = 2R$



* 9

$$f = 2R/3$$

$$f = \frac{1}{3}$$

$$R = 1.5$$



$$R = 1$$

SECTION – 2 : (One or more options correct Type)

खण्ड – 2 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)

This section contains 5 multiple choice questions. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which ONE or MORE are correct.

इस खण्ड में 5 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से एक या अधिक सही हैं।

11. A particle of mass M and positive charge Q , moving with a constant velocity $\vec{u}_1 = 4\hat{i} \text{ ms}^{-1}$, enters a region of uniform static magnetic field normal to the $x-y$ plane.

The region of the magnetic field extends from $x = 0$ to $x = L$ for all values of y . After passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with a velocity $\vec{u}_2 = 2(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}) \text{ ms}^{-1}$. The correct statement(s) is (are)

- (A) The direction of the magnetic field is $-z$ direction.
- (B) The direction of the magnetic field is $+z$ direction.
- (C) The magnitude of the magnetic field $\frac{50\pi M}{3Q}$ units.
- (D) The magnitude of the magnetic field is $\frac{100\pi M}{3Q}$ units.

एक M द्रव्यमान तथा Q धन आवेश का कण, जो $\vec{u}_1 = 4\hat{i} \text{ ms}^{-1}$ के एकसमान वेग से गतिशील है, एकसमान स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र $x-y$ तल के अभिलंबवत् है तथा इसका विस्तार क्षेत्र $x=0$ से $x=L$ तक प्रत्येक y के मान के लिए है।

इस चुंबकीय क्षेत्र को यह कण 10 मिली सेकंड में पार कर दूसरी ओर $\vec{u}_2 = 2(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ वेग से प्रकट होता है। सही प्रकथन है/हैं :

- (A) चुंबकीय क्षेत्र $-z$ दिशा में है।
- (B) चुंबकीय क्षेत्र $+z$ दिशा में है।
- (C) चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{50\pi M}{3Q}$ इकाई है।
- (D) चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{100\pi M}{3Q}$ इकाई है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान




12. Two non-conducting solid spheres of radii R and $2R$, having uniform volume charge densities ρ_1 and ρ_2 respectively, touch each other. The net electric field at a distance $2R$ from the centre of the smaller sphere, along the line joining the centres of the spheres, is zero. The ratio $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ can be

(A) -4

(C) $\frac{32}{25}$

(B) $-\frac{32}{25}$

(D) 4



दो R व $2R$ त्रिज्या वाले अचालक ठोस गोलकों को जिन पर क्रमशः ρ_1 तथा ρ_2 एकसमान आयतन आवेश घनत्व है, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा गया है। दोनों गोलकों के केंद्रों से गुजरती हुई रेखा खींची जाती है। इस रेखा पर छोटे गोलक के केंद्र से $2R$ दूरी पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य है। तब अनुपात $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ का मान हो सकता है :

(A) -4

(B) $-\frac{32}{25}$

(C) $\frac{32}{25}$

(D) 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\rho_2 \times \frac{12R}{25}$$

$$62 \frac{1}{2}$$

$$\frac{kq}{4R^2} \times \frac{kS_2}{(2R)^2}$$

$$\frac{kq}{4R^2} \times \frac{kq}{R^2}$$



13. A solid sphere of radius R and density ρ is attached to one end of a mass-less spring of force constant k . The other end of the spring is connected to another solid sphere of radius R and density 3ρ . The complete arrangement is placed in a liquid of density 2ρ and is allowed to reach equilibrium. The correct statement(s) is (are)

- (A) the net elongation of the spring is $\frac{4\pi R^3 \rho g}{3k}$.
- (B) the net elongation of the spring is $\frac{8\pi R^3 \rho g}{3k}$
- (C) the light sphere is partially submerged.
- (D) the light sphere is completely submerged.

एक त्रिज्या R व घनत्व ρ वाले ठोस गोलक को एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के एक सिरे से जोड़ा गया है। इस स्प्रिंग का बल नियतांक k है। स्प्रिंग के दूसरे सिरे को दूसरे ठोस गोलक से जोड़ा गया है जिसकी त्रिज्या R व घनत्व 3ρ है। पूर्ण विन्यास को 2ρ घनत्व के द्रव में रखा जाता है और इसको साम्यावस्था में पहुँचने दिया जाता है। सही प्रकथन हैं/हैं


- (A) स्प्रिंग की नेट दैर्घ्यवृद्धि $\frac{4\pi R^3 \rho g}{3k}$ है।
- (B) स्प्रिंग की नेट दैर्घ्यवृद्धि $\frac{8\pi R^3 \rho g}{3k}$ है।
- (C) हल्का गोलक आंशिक रूप से डूबा हुआ है।
- (D) हल्का गोलक पूर्ण रूप से डूबा हुआ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



14. In the circuit shown in the figure, there are two parallel plate capacitors each of capacitance C . The switch S_1 is pressed first to fully charge the capacitor C_1 and then released. The switch S_2 is then pressed to charge the capacitor C_2 . After some time, S_2 is released and then S_3 is pressed. After some time,

- (A) the charge on the upper plate of C_1 is $2CV_0$.
- (B) the charge on the upper plate of C_1 is CV_0 .
- (C) the charge on the upper plate of C_2 is 0.
- (D) the charge on the upper plate of C_2 is $-CV_0$.



$$\begin{aligned} C_1 &\parallel 2CV_0 \\ C_2 &\parallel 2CV_0 \\ \frac{2CV_0}{\frac{1}{C}} &= \frac{2CV_0}{C} \end{aligned}$$

चित्र में दर्शाये परिपथ में, दो समानान्तर प्लेटों वाले संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता C है। प्रारंभ में स्विच S_1 को दबाया जाता है ताकि संधारित्र C_1 पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए। इसके बाद S_1 को छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात संधारित्र C_2 को आवेशित करने के लिये स्विच S_2 को दबाया जाता है। कुछ समय के बाद S_2 को छोड़ दिया जाता है तथा S_3 को दबाया जाता है। कुछ समय बाद

- (A) C_1 की ऊपरी प्लेट पर $2CV_0$ आवेश है।
- (B) C_1 की ऊपरी प्लेट पर CV_0 आवेश है।
- (C) C_2 की ऊपरी प्लेट पर शून्य आवेश है।
- (D) C_2 की ऊपरी प्लेट पर $-CV_0$ आवेश है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



15. A horizontal stretched string, fixed at two ends, is vibrating in its fifth harmonic according to the equation, $y(x, t) = (0.01 \text{ m}) \sin [(62.8 \text{ m}^{-1}) x] \cos [(628 \text{ s}^{-1})t]$. Assuming $\pi = 3.14$, the correct statement(s) is (are)

- (A) The number of nodes is 5.
- (B) The length of the string is 0.25 m.
- (C) The maximum displacement of the midpoint of the string, from its equilibrium position is 0.01 m.
- (D) The fundamental frequency is 100 Hz.

दोनों सिरों पर परिबद्ध क्षैतिज तनित डोरी पाँचवीं गुणावृत्ति समीकरण $y(x, t) = (0.01 \text{ m}) \sin [(62.8 \text{ m}^{-1}) x] \cos [(628 \text{ s}^{-1})t]$ द्वारा कंपित हो रही है। यदि $\pi = 3.14$ माना जाय तब निम्न प्रकथन सही है/हैं

- (A) निर्धारित की संख्या 5 है।
- (B) डोरी की लम्बाई 0.25 m है।
- (C) साम्यावस्था से डोरी के मध्यबिन्दु का अधिकतम विस्थापन 0.01 m है।
- (D) मूल आवृत्ति 100 Hz है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



खण्ड - 3 : (पूर्णांक मान सही प्रकार)

This section contains 5 questions. The answer to each question is a single digit integer, ranging from 0 to 9 (both inclusive).

इस खण्ड में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एकल अंकीय पूर्णांक है।

16. A particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power 0.5 W to the particle. If the initial speed (in ms^{-1}) of the particle is zero, the speed (in ms^{-1}) after 5 s is

एक 0.2 kg द्रव्यमान का कण एक बल के अन्तर्गत, जो कि एक नियत शक्ति 0.5 W कण को देता है, एक दिशा में गतिशील है। यदि कण की प्रारंभिक गति शून्य है तब 5 s बाद इसकी गति (ms^{-1} में) होगी :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\begin{aligned}
 & m = 0.2 \text{ kg} \\
 & P = 0.5 \text{ W} \\
 & t = 5 \text{ s} \\
 & v = ? \\
 & \text{Work Done} = P \times t \\
 & \text{Work Done} = F \times d \\
 & F = ma \\
 & a = \frac{F}{m} \\
 & a = \frac{P}{m \times v} \\
 & v = \frac{P}{m \times a} \\
 & v = \frac{0.5}{0.2 \times 0.2} \\
 & v = 1.25 \text{ ms}^{-1}
 \end{aligned}$$



17. A uniform circular disc of mass 50 kg and radius 0.4 m is rotating with an angular velocity of 10 rad s^{-1} about its own axis, which is vertical. Two uniform circular rings, each of mass 6.25 kg and radius 0.2 m , are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of the disc and are horizontal. Assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disc and the system rotates about the original axis. The new angular velocity (in rad s^{-1}) of the system is

एक 50 kg व 0.4 m त्रिज्या की एकसमान डिस्क अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष के गिर्द 10 rad s^{-1} के कोणीय वेग से धूम रही है। दो एकसमान वृत्ताकार छल्ले धीरे से डिस्क पर सममित तरीके से एक दूसरे को छूते हुए इस प्रकार डिस्क तल पर रखे जाते हैं कि वे डिस्क के अक्ष को भी स्पर्श करें। प्रत्येक छल्ले का द्रव्यमान 6.25 kg व त्रिज्या 0.2 m है। इस निकाय का नया कोणीय वेग (rad s^{-1} में) निम्न होगा (मान लीजिये कि डिस्क एवम् छल्ले के बीच घर्षण इतना है कि डिस्क व छल्ले के बीच सापेक्ष गति शून्य है और निकाय मूल अक्ष पर धूर्णन कर रहा है) :

18. A freshly prepared sample of a radioisotope of half-life 1386 s has activity 10^3 disintegrations per second. Given that $\ln 2 = 0.693$, the fraction of the initial number of nuclei (expressed in nearest integer percentage) that will decay in the first 80 s after preparation of the sample is

एक तुरंत तैयार किया हुआ रेडियो आइसोटोप प्रतिदर्श, जिसकी अर्ध-आयु 1386 s है, की सक्रियता 10^3 विघटन प्रति सेकंड है। यदि $\ln 2 = 0.693$ है, तब प्रथम 80 s में विघटित नाभिकों व प्रारंभिक नाभिकों की संख्याओं का अनुपात (प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में) है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\frac{t}{t_{1/2}} = 2^{1386/1386}$$

$$\frac{t}{t_{1/2}} = 10^3/1386$$

$$10^3 = \frac{1386}{1386} \cdot 0.693 \ln \frac{4}{1-1}$$

$$\frac{1386}{1386} \cdot 0.693 \ln \frac{4}{1-1}$$

$$\frac{10^3}{1386} \cdot 0.693 \ln \frac{4}{1-1}$$

$$2 \times 10^3 \cdot \frac{15}{1000} \cdot 0.693 \ln \frac{4}{1-1}$$



19. A bob of mass m , suspended by a string of length l_1 , is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane. At the highest point, it collides elastically with another bob of mass m suspended by a string of length l_2 , which is initially at rest. Both the strings are mass-less and inextensible. If the second bob, after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, the ratio $\frac{l_1}{l_2}$ is

एक m द्रव्यमान का गोलक l_1 लम्बाई की डोरी से लटका हुआ है। इसे एक वेग दिया जाता है जो कि ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त पूरा कराने के लिए न्यूनतम है। अपने उच्चतम बिन्दु पर यह गोलक दूसरे m द्रव्यमान के गोलक से प्रत्यारथ संघट्ट करता है। दूसरा गोलक l_2 लम्बाई की डोरी से लटका हुआ है तथा प्रारंभ में विरामावरथा पर है। दोनों डोरियाँ द्रव्यमान रहित व अवितान्य हैं। यदि संघट्ट के बाद दूसरे गोलक को ऐसी गति प्राप्त होती है जो कि ऊर्ध्वाधर तल में पूर्ण वृत्त पूरा करने लिए न्यूनतम है, तब $\frac{l_1}{l_2}$ का अनुपात है :

20. The work functions of Silver and Sodium are 4.6 and 2.3 eV , respectively. The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for Silver to that of Sodium is

चाँदी एवं सोडियम के कार्य फलन क्रमशः 4.6 व 2.3 eV हैं। चाँदी व सोडियम के निरोधी विभव एवं आवृत्ति के बीच ग्राफों के ढाल का अनुपात है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

(1)

$\frac{1}{2.3}$



PART II: CHEMISTRY

SECTION – 1 : (Only One option correct Type)

खण्ड – 1 : (केवल एक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **10 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 10 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से केवल एक सही है।

21. Upon treatment with ammoniacal H_2S , the metal ion that precipitates as a sulfide is

एमोनिकल H_2S के साथ अभिक्रिया करने पर जिस धातु आयन का अवक्षेपण सल्फाइड के रूप में होता है, वह है

- (A) $Fe(III)$ (B) $Al(III)$
(C) $Mg(II)$ (D) $Zn(II)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ammonium

CHEMISTRY



22. In the reaction,




the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P .


The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is

- (A) 2
(C) 0

- (B) 3
(D) 1



निम्न अभिक्रिया,



में P की 75% अभिक्रिया का समय P की 50% अभिक्रिया में लिए गए समय की तुलना में दोगुना है।

Q की विभिन्न सांदर्भता, अभिक्रिया समय अनुसार चित्र में दर्शाई गई है। इस अभिक्रिया की समस्त कोटि है

- (A) 2
(C) 0

- (B) 3
(D) 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



23. Consider the following complex ions, P , Q and R .

$$P = [FeF_6]^{3-}, Q = [V(H_2O)_6]^{2+} \text{ and } R = [Fe(H_2O)_6]^{2+}.$$

The correct order of the complex ions, according to their spin-only magnetic moment values (in B.M.) is

(A) $R < Q < P$

(B) $\checkmark Q < R < P$

(C) $R < P < Q$

(D) $Q < P < R$

निम्नलिखित संकुल आयनों P , Q एवं R पर विचार कीजिए :

$$P = [FeF_6]^{3-}, Q = [V(H_2O)_6]^{2+} \text{ और } R = [Fe(H_2O)_6]^{2+}.$$

संकुल आयनों का सही क्रम उनके प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण मान (B.M. में) के अनुसार है

(A) $R < Q < P$

(B) $\checkmark Q < R < P$

(C) $R < P < Q$


(D) $Q < P < R$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



24. The arrangement of X^- ions around A^+ ion in solid AX is given in the figure (not drawn to scale). If the radius of X^- is 250 pm , the radius of A^+ is

- (A) 104 pm (B) 125 pm (C) 183 pm (D) 57 pm



एक ठोस AX में A^+ आयन पर X^- आयनों की व्यवस्था (सही मापसूचक में नहीं) चित्र में दी गई है। यदि X^- का अर्द्धव्यास 250 pm है, तब A^+ का अर्द्धव्यास होगा

- (A) 104 pm (B) 125 pm (C) 183 pm (D) 57 pm

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



25. Concentrated nitric acid, upon long standing, turns yellow-brown due to the formation of

- (A) NO (B) NO_2 (C) $\cancel{N_2O}$ (D) N_2O_4

सांद्र नाइट्रिक अम्ल का काफी समय बाद पीले-भूरे रंग में परिवर्तित होना किसके बनने से होता है ?

- (A) NO (B) NO_2 (C) N_2O (D) N_2O_4

26. The compound that does **NOT** liberate CO_2 , on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution, is

- (A) Benzoic acid (B) Benzenesulphonic acid
 (C) Salicylic acid (D) $\cancel{Carbolic\ acid\ (Phenol)}$

यौगिक जो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन द्वारा अभिक्रिया कर CO_2 नहीं देता है, वह है

- (A) बेन्जोइक अम्ल (B) बेन्जीनसल्फोनिक अम्ल
 (C) सेलिसिलिक अम्ल (D) कारबोलिक अम्ल (फीनॉल)

27. Sulfide ores are common for the metals

- (A) $\cancel{Ag, Cu \text{ and } Pb}$ (B) $Ag, Cu \text{ and } Sn$ (C) $Ag, Mg \text{ and } Pb$ (D) $Al, Cu \text{ and } Pb$

सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाने वाले धातु हैं

- (A) Ag, Cu और Pb (B) Ag, Cu और Sn (C) Ag, Mg और Pb (D) Al, Cu और Pb

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



28. Methylene blue, from its aqueous solution, is adsorbed on activated charcoal at 25 °C. For this process, the correct statement is

- (A) The adsorption requires activation at 25 °C.
- (B) The adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy.
- (C) The adsorption increases with increase of temperature.
- (D) The adsorption is irreversible.


25 °C तापमान पर एक जलीय विलयन से मेथिलिन ब्लू का सक्रियत चारकोल पर अधिशोषण किया गया। इस प्रक्रम के लिये सही कथन है

- (A) अधिशोषण को 25 °C पर सक्रियण की आवश्यकता होती है।
- (B) अधिशोषण प्रक्रम में एन्थैलपी घटती है।
- (C) अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है।
- (D) अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान




29. KI in acetone, undergoes S_N2 reaction with each of **P**, **Q**, **R** and **S**. The rates of the reaction vary as



- (A) ~~$P > Q > R > S$~~
 (B) $S > P > R > Q$
 (C) ~~$P > R > Q > S$~~
 (D) $R > P > S > Q$

एसिटोन में KI के विलयन की प्रत्येक **P**, **Q**, **R** और **S** के साथ अलग-अलग S_N2 अभिक्रिया होती है।

इन अभिक्रिया की दरों के परिवर्तन का सही क्रम है



- (A) $P > Q > R > S$
 (B) $S > P > R > Q$
 (C) $P > R > Q > S$
 (D) $R > P > S > Q$



30. The standard enthalpies of formation of $CO_2(g)$, $H_2O(l)$ and glucose(s) at $25^\circ C$ are -400 kJ/mol , -300 kJ/mol and -1300 kJ/mol , respectively. The standard enthalpy of combustion per gram of glucose at $25^\circ C$ is

- (A) $+2900\text{ kJ}$
 (B) -2900 kJ
 (C) -16.11 kJ
 (D) ~~$+16.11\text{ kJ}$~~

$CO_2(g)$, $H_2O(l)$ तथा ग्लूकोस (ठोस) की विरचन मानक एंथैल्पीज $25^\circ C$ पर क्रमशः -400 kJ/मोल , -300 kJ/मोल और -1300 kJ/मोल हैं। प्रति ग्राम ग्लूकोस की $25^\circ C$ पर दहन मानक एंथैल्पी है

- (A) $+2900\text{ kJ}$
 (B) -2900 kJ
 (C) -16.11 kJ
 (D) $+16.11\text{ kJ}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



SECTION – 2 : (One or more options correct Type)**खण्ड – 2 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)**

This section contains **5 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONE or MORE** are correct.

इस खण्ड में 5 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से एक या अधिक सही हैं।

31. The hyperconjugative stabilities of tert-butyl cation and 2-butene, respectively, are due to

- (A) $\sigma \rightarrow p$ (empty) and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.
- (B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.
- (C) $\sigma \rightarrow p$ (filled) and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.
- (D) p (filled) $\rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.

tert-ब्यूटिल धनायन और 2-ब्यूटीन क्रमशः में अतिसंयुग्मन स्थिरता जिन कारणों से होती है, वे हैं

- (A) $\sigma \rightarrow p$ (रिक्त) और $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण
- (B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण
- (C) $\sigma \rightarrow p$ (पूरित) और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण
- (D) p (पूरित) $\rightarrow \sigma^*$ और $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



32. Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement(s) is(are)

(A) ΔG is positive

(B) ΔS_{system} is positive

(C) $\cancel{\Delta S}_{\text{surroundings}} = 0$

(D) $\cancel{\Delta H} = 0$

बेन्जीन और नेपथलीन साधारण तापमान पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। इस प्रक्रम के लिये सही कथन है (हैं)

(A) ΔG धनात्मक है।

(B) $\Delta S_{(\text{निकाय})}$ धनात्मक है।


(C) $\Delta S_{(\text{परिवेश})} = 0$

(D) $\Delta H = 0$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



33. Among *P*, *Q*, *R* and *S*, the aromatic compound(s) is/are

(A) *P*(B) *Q*(C) *R*(D) *S*

P, *Q*, *R* और *S* में ऐरोमेटिक यौगिक हैं/हैं

(A) *P*(B) *Q*(C) *R*(D) *S*

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



34. The initial rate of hydrolysis of methyl acetate ($1M$) by a weak acid (HA , $1M$) is $1/100^{\text{th}}$ of that of a strong acid (HX , $1M$), at 25°C . The K_a of HA is

- (A) 1×10^{-4} (B) 1×10^{-5} (C) 1×10^{-6} (D) 1×10^{-3}

मेथिल एसीटेट ($1M$) की दुर्बल अम्ल (HA , $1M$) द्वारा जल अपघटन की प्रारंभिक दर 25°C पर प्रबल अम्ल (HX , $1M$) की तुलना में $1/100$ है। HA के K_a का मूल्यांकन है

- (A) 1×10^{-4} (B) 1×10^{-5} (C) 1×10^{-6} (D) 1×10^{-3}

35. The pair(s) of coordination complexes/ions exhibiting the same kind of isomerism is(are)

- (A) ~~$[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$ and $[Cr(NH_3)_4Cl_2]Cl$~~
 (B) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ and $[Pt(NH_3)_2(H_2O)Cl]^+$
 (C) ~~$[CoBr_2Cl_2]^{2-}$ and $[PtBr_2Cl_2]^{2-}$~~
 (D) $[Pt(NH_3)_3(NO_3)]Cl$ and $[Pt(NH_3)_3Cl]Br$

उप-सहसंयोजक यौगिकों/आयन्स के युग्म समूह में जो एक ही प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, वह हैं

- (A) $[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$ और $[Cr(NH_3)_4Cl_2]Cl$
 (B) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ और $[Pt(NH_3)_2(H_2O)Cl]^+$
 (C) $[CoBr_2Cl_2]^{2-}$ और $[PtBr_2Cl_2]^{2-}$
 (D) $[Pt(NH_3)_3(NO_3)]Cl$ और $[Pt(NH_3)_3Cl]Br$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान




SECTION – 3 : (Integer value correct Type)**खण्ड – 3 : (पूर्णांक मान सही प्रकार)**

This section contains 5 questions. The answer to each question is a **single digit integer**, ranging from 0 to 9 (*both inclusive*).

इस खण्ड में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एकल अंकीय पूर्णांक है।

36. $EDTA^{4-}$ is ethylenediaminetetraacetate ion. The total number of $N-Co-O$ bond angles in $[Co(EDTA)]^{1-}$ complex ion is



$EDTA^{4-}$ एथिलीन डाइऐमीन टेट्राएसीटेट आयन है। संकुल आयन $[Co(EDTA)]^{1-}$ में $N-Co-O$ आबंध कोणों की कुल संख्या है।

37. The total number of lone-pairs of electrons in melamine is

मेलामीन पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की कुल संख्या है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



38. A tetrapeptide has $-COOH$ group on alanine. This produces glycine (Gly), valine (Val), phenyl alanine (Phe) and alanine (Ala), on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequences (primary structures) with $-NH_2$ group attached to a chiral center is

एक टेट्रापेप्टाइड में एलानीन पर $-COOH$ ग्रुप विद्यमान है। इसके संपूर्ण जल अपघटन द्वारा ग्लाइसिन (Gly), वैलीन (Val), फेनिल ऐलानिन (Phe) तथा ऐलानिन (Ala) प्राप्त होते हैं। इस टेट्रापेप्टाइड की संभावित शृंखलाओं (प्राथमिक संरचनाओं) की संख्या बताएँ जिनमें $-NH_2$ ग्रुप किरेल केंद्र के साथ आबंधित है।


39. The atomic masses of He and Ne are 4 and 20 a.m.u., respectively. The value of the de Broglie wavelength of He gas at -73°C is " M " times that of the de Broglie wavelength of Ne at 727°C . M is

(4)

He और Ne के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 4 और 20 a.m.u. है। He गैस की -73°C पर दें ब्रॉग्ली तरंग लम्बाई Ne की 727°C पर दें ब्रॉग्ली तरंग लम्बाई से "M" गुना है। M का मान है

40. The total number of carboxylic acid groups in the product P is

उत्पाद P में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूहों की कुल संख्या है



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART III : MATHEMATICS

SECTION – 1 : (Only One option correct Type)

खण्ड – 1 : (केवल एक सही विकल्प प्रकार)

This section contains 10 **multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 10 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से केवल एक सही है।

41. A curve passes through the point $\left(1, \frac{\pi}{6}\right)$. Let the slope of the curve at each point

(x, y) be $\frac{y}{x} + \sec\left(\frac{y}{x}\right)$, $x > 0$. Then the equation of the curve is

(A) $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

(B) $\operatorname{cosec}\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + 2$

(C) $\sec\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + 2$

(D) $\cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

एक वक्र बिन्दु $\left(1, \frac{\pi}{6}\right)$ से गुजरता है। माना कि प्रत्येक बिन्दु (x, y) पर वक्र की प्रवणता

$\frac{y}{x} + \sec\left(\frac{y}{x}\right)$, $x > 0$ है, तब वक्र का समीकरण है :

(A) $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

(B) $\operatorname{cosec}\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + 2$

(C) $\sec\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + 2$

(D) $\cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

* 9

$\sec(\theta)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$

$\operatorname{cosec}(\theta)$ $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{2}$

$\cos(\theta)$ $\frac{d^3y}{dx^3} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^4y}{dx^4} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^5y}{dx^5} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^6y}{dx^6} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^7y}{dx^7} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^8y}{dx^8} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^9y}{dx^9} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{10}y}{dx^{10}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{11}y}{dx^{11}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{12}y}{dx^{12}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{13}y}{dx^{13}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{14}y}{dx^{14}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{15}y}{dx^{15}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{16}y}{dx^{16}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{17}y}{dx^{17}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{18}y}{dx^{18}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{19}y}{dx^{19}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{20}y}{dx^{20}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{21}y}{dx^{21}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{22}y}{dx^{22}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{23}y}{dx^{23}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{24}y}{dx^{24}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{25}y}{dx^{25}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{26}y}{dx^{26}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{27}y}{dx^{27}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{28}y}{dx^{28}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{29}y}{dx^{29}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{30}y}{dx^{30}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{31}y}{dx^{31}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{32}y}{dx^{32}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{33}y}{dx^{33}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{34}y}{dx^{34}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{35}y}{dx^{35}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{36}y}{dx^{36}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{37}y}{dx^{37}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{38}y}{dx^{38}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{39}y}{dx^{39}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{40}y}{dx^{40}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{41}y}{dx^{41}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{42}y}{dx^{42}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{43}y}{dx^{43}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{44}y}{dx^{44}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{45}y}{dx^{45}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{46}y}{dx^{46}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{47}y}{dx^{47}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{48}y}{dx^{48}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{49}y}{dx^{49}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{50}y}{dx^{50}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{51}y}{dx^{51}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{52}y}{dx^{52}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{53}y}{dx^{53}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{54}y}{dx^{54}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{55}y}{dx^{55}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{56}y}{dx^{56}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{57}y}{dx^{57}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{58}y}{dx^{58}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{59}y}{dx^{59}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{60}y}{dx^{60}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{61}y}{dx^{61}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{62}y}{dx^{62}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{63}y}{dx^{63}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{64}y}{dx^{64}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{65}y}{dx^{65}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{66}y}{dx^{66}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{67}y}{dx^{67}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{68}y}{dx^{68}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{69}y}{dx^{69}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{70}y}{dx^{70}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{71}y}{dx^{71}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{72}y}{dx^{72}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{73}y}{dx^{73}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{74}y}{dx^{74}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{75}y}{dx^{75}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{76}y}{dx^{76}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{77}y}{dx^{77}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{78}y}{dx^{78}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{79}y}{dx^{79}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{80}y}{dx^{80}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{81}y}{dx^{81}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{82}y}{dx^{82}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{83}y}{dx^{83}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{84}y}{dx^{84}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{85}y}{dx^{85}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{86}y}{dx^{86}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{87}y}{dx^{87}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{88}y}{dx^{88}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{89}y}{dx^{89}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{90}y}{dx^{90}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{91}y}{dx^{91}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{92}y}{dx^{92}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{93}y}{dx^{93}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{94}y}{dx^{94}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{95}y}{dx^{95}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{96}y}{dx^{96}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{97}y}{dx^{97}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{98}y}{dx^{98}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{99}y}{dx^{99}} = -\frac{1}{2}$

$\sec(\theta)$ $\frac{d^{100}y}{dx^{100}} = -\frac{1}{2}$



42. Perpendiculars are drawn from points on the line $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ to the plane $x + y + z = 3$. The feet of perpendiculars lie on the line

(A) $\frac{x}{5} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-2}{-13}$

(C) $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-7}$

$\frac{8}{-13} = \frac{3}{-1} = \frac{21}{-13}$

$\frac{-2}{13} = \frac{-1}{1} = \frac{13}{-13}$

(B) $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-5}$

(D) $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z-2}{5}$

$-14/13 + 2/13 + 4/13$

$= -1/13$

$2d-2, -d-1, 2d$

$n+4, 1/2$

तल $x + y + z = 3$ पर रेखा $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ पर स्थित बिन्दुओं से लम्ब डाले जाते हैं।

लम्ब-पाद निम्न रेखा पर स्थित हैं:

(A) $\frac{x}{5} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-2}{-13}$

(C) $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-7}$

$\frac{-3}{2} = \frac{3/2}{3} = \frac{-1}{13}$

$\frac{-1}{5} = \frac{-4/13}{-7} = \frac{3R+4=3}{n=13}$

(B) $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-5}$

$\frac{3}{2} = \frac{1/2}{-7} = \frac{-2/13}{y=13}$

$n=2m+3$

$y=k-1, \frac{3k+2}{5}$

$2=k+3, \frac{3k+2}{5}$

$n+2+k-1+k+3=3$

$3k-2=3$

43. For $a > b > c > 0$, the distance between $(1, 1)$ and the point of intersection of the lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c = 0$ is less than $2\sqrt{2}$. Then

(A) $a + b - c > 0$

(C) $a - b + c > 0$

(B) $a - b + c < 0$

(D) $a + b - c < 0$

$a > b > c > 0$ के लिए, $(1, 1)$ तथा रेखाओं $ax + by + c = 0$ व $bx + ay + c = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु के बीच की दूरी $2\sqrt{2}$ से कम है, तब

(A) $a + b - c > 0$

(C) $a - b + c > 0$

(B) $a - b + c < 0$

(D) $a + b - c < 0$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\frac{2d-2}{1} = \frac{-1/13}{1} = \frac{3/2}{-1} = \frac{k}{2} \quad y(3/2) = \frac{c(a+b)}{(a+b)(b+a)}$$

$$2d-2 = -1/13 = 3/2 = k \quad 2d-2, -d-1, 3d, y = \frac{c(b+a)}{b-a}$$

$$2d-2 = -1/13 = 3/2 = k \quad n+2 = \frac{c(b+a)}{b-a}$$

$$3d = 1 \quad d = \frac{n+2}{2} \quad d = 0 \quad d = 1 \quad n+2+2=3$$

$$d = -1/13, d = 1/2 \quad d = -2/13$$

$$3 = k = 2 \quad A=2$$

44. The area enclosed by the curves $y = \sin x + \cos x$ and $y = |\cos x - \sin x|$ over the interval $[0, \frac{\pi}{2}]$ is

(A) $4(\sqrt{2} - 1)$ (B) $2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$ (C) $2(\sqrt{2} + 1)$ (D) $2\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)$

अंतराल $[0, \frac{\pi}{2}]$ पर वक्रों $y = \sin x + \cos x$ तथा $y = |\cos x - \sin x|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है:

(A) $4(\sqrt{2} - 1)$ (B) $2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$ (C) $2(\sqrt{2} + 1)$ (D) $2\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)$

45. Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one

of them is

(A) $\frac{235}{256}$

(B) $\frac{21}{256}$

(C) $\frac{3}{256}$

(D) $\frac{253}{256}$

चार व्यक्ति स्वतंत्रतया किसी एक समस्या को प्रायिकताओं $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ के साथ ठीक हल

करते हैं, तब समस्या के उनमें से कम से कम एक व्यक्ति द्वारा ठीक हल किये जाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{235}{256}$

(B) $\frac{21}{256}$

(C) $\frac{3}{256}$

(D) $\frac{253}{256}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



1356

46. Let complex numbers α and $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ lie on circles $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ and $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 4r^2$, respectively. If $z_0 = x_0 + iy_0$ satisfies the equation

$$2|z_0|^2 = r^2 + 2,$$

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

(D) $\frac{1}{3}$

माना कि सम्मिश्र संख्याएँ α तथा $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ क्रमशः वृत्त $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ तथा $(x - x_0)^2 +$

$(y - y_0)^2 = 4r^2$ पर स्थित हैं। यदि $z_0 = x_0 + iy_0$ समीकरण $2|z_0|^2 = r^2 + 2$ को सन्तुष्ट

करता है, तब $|z_0| =$

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

(D) $\frac{1}{3}$

47. The number of points in $(-\infty, \infty)$, for which $x^2 - x \sin x - \cos x = 0$, is

(A) 6

(B) 4

(C) 2

(D) 0

$(-\infty, \infty)$ में बिन्दुओं की संख्या, जिनके लिए $x^2 - x \sin x - \cos x = 0$, है :

(A) 6

(B) 4

(C) 2

(D) 0

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

48. Let $f: \left[\frac{1}{2}, 1\right] \rightarrow \mathbb{R}$ (the set of all real numbers) be a positive, non-constant and differentiable function such that $f'(x) < 2f(x)$ and $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Then the value of

$$\int_{1/2}^1 f(x) dx \text{ lies in the interval}$$

(A) $(2e - 1, 2e)$

(C) $\left(\frac{e-1}{2}, e-1\right)$

माना कि $f: \left[\frac{1}{2}, 1\right] \rightarrow \mathbb{R}$ (सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) एक धनात्मक, अचरेतर

तथा अवकलनीय फलन है जिसके लिये $f'(x) < 2f(x)$ तथा $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ है, तब $\int_{1/2}^1 f(x) dx$

का मान निम्न अन्तराल में है :

(A) $(2e - 1, 2e)$

(C) $\left(\frac{e-1}{2}, e-1\right)$

(B) $(e-1, 2e-1)$

(D) $\left(0, \frac{e-1}{2}\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



49. Let $\vec{PR} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ determine diagonals of a parallelogram $PQRS$ and $\vec{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ be another vector. Then the volume of the parallelepiped determined by the vectors \vec{PT} , \vec{PQ} and \vec{PS} is
- (A) 5 (B) 20 (C) 10 (D) 30

माना कि $\vec{PR} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ एक समांतर चतुर्भुज $PQRS$ के विकर्ण निर्धारित करते हैं और $\vec{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ एक अन्य सदिश है। तब सदिशों \vec{PT} , \vec{PQ} तथा \vec{PS} द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन है :

- (A) 5 (B) 20 (C) 10 (D) 30
50. The value of $\cot \left(\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1} \left(1 + \sum_{k=1}^n 2k \right) \right)$ is
- (A) $\frac{23}{25}$ (B) $\frac{25}{23}$ (C) $\frac{23}{24}$ (D) $\frac{24}{23}$
- $\cot \left(\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1} \left(1 + \sum_{k=1}^n 2k \right) \right)$ का मान है :
- (A) $\frac{23}{25}$ (B) $\frac{25}{23}$ (C) $\frac{23}{24}$ (D) $\frac{24}{23}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION – 2 : (One or more options correct Type)

खण्ड – 2 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)

This section contains 5 multiple choice questions. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which ONE or MORE are correct.

इस खण्ड में 5 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से एक या अधिक सही हैं।

51. Let $f(x) = x \sin \pi x, x > 0$. Then for all natural numbers n , $f'(x)$ vanishes at

(A) a unique point in the interval $\left(n, n + \frac{1}{2}\right)$

$(n, n + \frac{1}{2})$

(B) a unique point in the interval $\left(n + \frac{1}{2}, n + 1\right)$

$f'(x) = (\sin nx + n \cos nx)x^{-1}$

(C) a unique point in the interval $(n, n + 1)$

$1, 3/2$ \circ $1 + 2$ $0 + 1$

(D) two points in the interval $(n, n + 1)$

$3/2$

माना कि $f(x) = x \sin \pi x, x > 0$, तब सभी धन-पूर्णांकों n के लिए $f'(x)$ निम्न पर शून्य होता है:

(A) अंतराल $\left(n, n + \frac{1}{2}\right)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

$3/2$ \circ $8/2$

(B) अंतराल $\left(n + \frac{1}{2}, n + 1\right)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

$7/2$ \circ $3/2 + 1/2$

(C) अंतराल $(n, n + 1)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

(D) अंतराल $(n, n + 1)$ में दो बिन्दुओं पर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$\sin nx$ $\cos nx$ n

$(1, 3/2)$

$n(1/2, 1/2)$

$(3/2, 2)$

$1/2$

$(1, 2)$



52. A rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their lengths in the ratio 8 : 15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all four corners. If the total area of removed squares is 100, the resulting box has maximum volume. Then the lengths of the sides of the rectangular sheet are


- (A) 24 (B) 32 (C) 45 (D) 60

एक निश्चित परिमाप की आयताकार चादर को, जिसकी भुजाओं की लम्बाइयाँ 8 : 15 के अनुपात में हैं, सभी चारों किनारों से समान क्षेत्रफल के वर्ग निकाल कर एक खुली आयताकार पेटी में परिवर्तित किया जाता है। यदि निकाले गये वर्गों का कुल क्षेत्रफल 100 है, तब परिणामी पेटी का आयतन महत्तम है। तब आयताकार चादर की भुजाओं की लम्बाइयाँ निम्न हैं :

- (A) 24 (B) 32 (C) 45 (D) 60

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$\begin{matrix} 8 \\ 4 \times 15 \end{matrix}$$



$$\begin{matrix} 8 \\ 15 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 32^4 \\ 45 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 48 \times 8 \\ 60 \times 4 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 15^2 \\ 8 \end{matrix}$$



53. For 3×3 matrices M and N , which of the following statement(s) is (are) NOT correct ?

- (A) $N^T M N$ is symmetric or skew symmetric, according as M is symmetric or skew symmetric
- (B) $MN - NM$ is skew symmetric for all symmetric matrices M and N
- (C) MN is symmetric for all symmetric matrices M and N
- (D) $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(MN)$ for all invertible matrices M and N

3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए निम्न में से कौन प्रकथन सत्य नहीं है (है) ?

- (A) M के सममित या विषम-सममित होने के अनुसार $N^T MN$ सममित या विषम-सममित है।
- (B) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $MN - NM$ विषम-सममित है।
- (C) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए MN सममित है।
- (D) सभी व्युत्क्रमणीय आव्यूहों M तथा N के लिए $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(MN)$ ।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



54. A line l passing through the origin is perpendicular to the lines

$$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty$$

$$l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$$

Then, the coordinate(s) of the point(s) on l_2 at a distance of $\sqrt{17}$ from the point of intersection of l and l_1 is (are)

- (A) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$ (B) $(-1, -1, 0)$ (C) $(1, 1, 1)$ (D) $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$

एक रेखा l , जो मूलबिन्दु से गुजरती है, रेखाओं

$$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty$$

$$l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$$

पर लम्बवत है। तब, l_2 पर स्थित बिन्दु (बिन्दुओं) के निर्देशांक, जो रेखाओं l तथा l_1 के प्रतिच्छेद बिन्दु से $\sqrt{17}$ की दूरी पर है (हैं), निम्न है (हैं) :

- (A) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$ (B) $(-1, -1, 0)$ (C) $(1, 1, 1)$ (D) $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$

55. Let $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$. Then S_n can take value(s)

- (A) 1056 (B) 1088 (C) 1120 (D) 1332

माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$, तब S_n निम्न मान ले सकता है :

- (A) 1056 (B) 1088 (C) 1120 (D) 1332

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

$$S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$$

(-1)

$$(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \dots + (-1)^{4n}$$

$$1 + (-1) + 1$$

* 9

39



SECTION – 3 : (Integer value correct Type)**खण्ड – 3 : (पूर्णांक मान सही प्रकार)**

This section contains 5 questions. The answer to each question is a single digit integer, ranging from 0 to 9 (both inclusive).

इस खण्ड में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एकल अंकीय पूर्णांक है।

56. Of the three independent events E_1 , E_2 and E_3 , the probability that only E_1 occurs is α , only E_2 occurs is β and only E_3 occurs is γ . Let the probability p that none of events E_1 , E_2 or E_3 occurs satisfy the equations $(\alpha - 2\beta)p = \alpha\beta$ and $(\beta - 3\gamma)p = 2\beta\gamma$. All the given probabilities are assumed to lie in the interval (0, 1).

$$\text{Then } \frac{\text{Probability of occurrence of } E_1}{\text{Probability of occurrence of } E_3} =$$

तीन स्वतंत्र घटनाओं E_1 , E_2 तथा E_3 में से केवल E_1 के घटने की प्रायिकता α है, केवल E_2 के घटने की प्रायिकता β है तथा केवल E_3 के घटने की प्रायिकता γ है। माना कि घटनाओं E_1 , E_2 या E_3 में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता p , समीकरणों $(\alpha - 2\beta)p = \alpha\beta$ तथा $(\beta - 3\gamma)p = 2\beta\gamma$ को सन्तुष्ट करती है। सभी प्रायिकताएँ अन्तराल (0, 1) में स्थित मानी जाती हैं, तब

$$\frac{E_1 \text{ के घटने की प्रायिकता}}{E_3 \text{ के घटने की प्रायिकता}} =$$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



57. A vertical line passing through the point $(h, 0)$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ at the points P and Q . Let the tangents to the ellipse at P and Q meet at the point R .

If $\Delta(h) = \text{area of the triangle } PQR$, $\Delta_1 = \max_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$ and $\Delta_2 = \min_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$, then

$$\frac{8}{\sqrt{5}} \Delta_1 - 8\Delta_2 =$$

बिन्दु $(h, 0)$ से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है। माना कि बिन्दुओं P तथा Q पर दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखाएँ बिन्दु R पर मिलती हैं। यदि $\Delta(h) = \text{त्रिभुज } PQR \text{ का क्षेत्रफल}$, $\Delta_1 = \max_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$ और $\Delta_2 = \min_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$

$$\text{है, तब } \frac{8}{\sqrt{5}} \Delta_1 - 8\Delta_2 =$$

58. A pack contains n cards numbered from 1 to n . Two consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smaller of the numbers on the removed cards is k , then $k - 20 =$

एक गड्ढी में n कार्ड हैं जो संख्याओं 1 से n द्वारा चिह्नित हैं। दो क्रमागत संख्याओं वाले कार्ड गड्ढी से निकाल दिये जाते हैं और अवशिष्ट कार्डों की संख्याओं का योग 1224 है। यदि निकाले गए कार्डों की चिह्नित संख्याओं में से लघुतर संख्या k है, तब $k - 20 =$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

① R

sum = $\frac{n(n+1)}{2}$

1224

$$\frac{n(n+1)}{2} - (k+k+1) = 1224$$

$\frac{n(n+1)}{2} - 2k - 1 = 1224$

$$\frac{n(n+1)}{2} - 2k - 1 = 1224$$

* 9

41

$$\frac{n(n+1)}{2} - 2k - 1 = 1224$$

59. Consider the set of eight vectors $V = \left\{ a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\} \right\}$. Three non-coplanar vectors can be chosen from V in 2^p ways. Then p is


आठ सदिशों का समुच्चय $V = \left\{ a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\} \right\}$ लीजिये। V से तीन असमतलीय सदिश 2^p प्रकार से चुने जा सकते हैं। तब p का मान है :

60. The coefficients of three consecutive terms of $(1+x)^{n+5}$ are in the ratio $5 : 10 : 14$.

Then $n =$

$(1+x)^{n+5}$ के तीन क्रमागत पदों के गुणांक $5 : 10 : 14$ के अनुपात में हैं। तब, $n =$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



$$\textcircled{O} (1+n)^{n+5}$$



कच्चे कार्य के लिए स्थान / Space for Rough Work



13. अपना नाम, रोल नं. और परीक्षा केंद्र का नाम ओ.आर.एस. के दाँड़ भाग में दिए गए खानों में कलम से भरें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी जानकारी कहीं और न लिखें। रोल नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले (BUBBLE) को इस तरह से काला करें कि निचले पृष्ठ पर भी निशान बन जाए।

Write your Name, Roll No. and the name of centre and sign with pen in the boxes provided on the right part of ORS. **Do not write any of this anywhere else.** Darken the appropriate bubble **UNDER** each digit of your Roll No. in such a way that the impression is created on the bottom sheet.

C. प्रश्न-पत्र का प्रारूप

इस प्रश्न-पत्र के तीन भाग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) हैं। हर भाग के तीन खंड हैं।

14. **खंड 1** में 10 बहुविकल्प प्रश्न हैं। हर प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक ही सही है।

C. Question Paper Format

The question paper consists of **three parts** (Physics, Chemistry and Mathematics). Each part consists of three sections.

Section 1 contains **10 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.

15. **खंड 2** में 5 बहुविकल्प प्रश्न हैं। हर प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या अधिक सही हैं।

Section 2 contains **5 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONE or MORE** are correct.

16. **खंड 3** में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एकल अंकीय पूर्णांक है।

Section 3 contains **5 questions**. The answer to each question is a single-digit integer, ranging from 0 to 9 (both inclusive).

D. अंकन योजना

17. खंड 1 में हर प्रश्न में केवल सही उत्तर वाले बुलबुले (BUBBLE) को काला करने पर 2 अंक और कोई भी बुलबुला काला नहीं करने पर शून्य (0) अंक प्रदान किए जायेंगे। इस खंड के प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे।

D. Marking Scheme

For each question in **Section 1**, you will be awarded **2 marks** if you darken the bubble corresponding to the correct answer and **zero mark** if no bubbles are darkened. **No negative marks** will be awarded for incorrect answers in this section.

18. खंड 2 के हर प्रश्न में केवल सही उत्तरों (उत्तर) वाले सभी बुलबुलों (बुलबुले) को काला करने पर 4 अंक प्रदान किए जायेंगे और कोई भी बुलबुला काला नहीं करने पर शून्य (0) अंक प्रदान किए जायेंगे। अन्य सभी स्थितियों में ऋणात्मक एक (-1) अंक प्रदान किया जायेगा।

For each question in **Section 2**, you will be awarded **4 marks** if you darken all the bubble(s) corresponding to only the correct answer(s) and **zero mark** if no bubbles are darkened. In all other cases, **minus one (-1) mark** will be awarded.

19. खंड 3 के हर प्रश्न में केवल सही उत्तर वाले बुलबुले को काला करने पर 4 अंक प्रदान किए जायेंगे और कोई भी बुलबुला काला नहीं करने पर शून्य (0) अंक प्रदान किए जायेंगे। अन्य सभी स्थितियों में ऋणात्मक एक (-1) अंक प्रदान किया जायेगा।

For each question in **Section 3**, you will be awarded **4 marks** if you darken the bubble corresponding to only the correct answer and **zero mark** if no bubbles are darkened. In all other cases, **minus one (-1) mark** will be awarded.

परीक्षार्थी का नाम

Name of the Candidate

SHUBHAM SAHA.

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।
I have read all the instructions and shall abide by them.

Shubham Saha

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

रोल नम्बर

Roll Number

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|

परीक्षार्थी द्वारा भरी गई सारी जानकारी को मैंने जाँच लिया है।

I have verified all the information filled by the candidate.

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of the Invigilator